

# คู่มือ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

- คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์









บันทึก

การวินิจฉัยโรค ( Diagnosis ).....

.....

.....

ระยะโรค ( Staging ).....

.....

การตรวจพิเศษ ( Investigation ).....

.....

.....

การผ่าตัด( Operation ).....

.....

.....

ผลชิ้นเนื้อ ( Patho ).....

.....

.....

Chemotherapy regimen.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....















## การปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการข้างเคียงสำหรับ ผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด

### 1. คลื่นไส้ อาเจียน

อาการคลื่นไส้ อาเจียนอาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หลังการรักษาและบางครั้งอาจนานถึง 1 สัปดาห์ โดยปกติแล้วจะได้รับยาแก้อาเจียนร่วมด้วย พร้อมกับการรักษาและให้ยากลับไปรับประทานต่อที่บ้านอยู่แล้ว หากมีอาการมาก รับประทานไม่ได้ อ่อนเพลีย ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด

- ⊗ รับประทานอาหารที่ละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง โดยแบ่งเป็นมื้อ 5 – 6 มื้อ
- ⊗ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เช่น น้ำเปล่า น้ำผลไม้ น้ำที่ไม่มีส่วนประกอบของคาเฟอีน
- ⊗ หลีกเลี่ยง อาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน เพราะเป็นอาหารที่ย่อยยากและอาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน และอาหารที่มีกลิ่นแรง
- ⊗ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ด หรือมีความเป็นกรด อาหารที่มีไขมันสูง
- ⊗ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวล
- ⊗ นั่งพักหลังรับประทานอาหารจะช่วยให้การย่อยดีขึ้น แต่ห้ามนอนราบเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงรับประทานอาหารเพราะจะทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้



## เคมีบำบัด คืออะไร

โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง บางครั้งอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ ผอมร่วง ปวดเมื่อยร่างกาย อ่อนเพลีย ผิวหนังหรือเล็บมือเปลี่ยนสี อาการชา ท้องเสีย ซึ่งอาการเหล่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยา สภาพความแข็งแรงของร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้ป่วย

การให้ยาเคมีบำบัด แบ่งง่ายๆ เป็น 2 วิธี หลัก

1. ยาเคมีบำบัดชนิดรับประทาน
2. ยาเคมีบำบัดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัด ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค มะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น รวมทั้งผลการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้วิเคราะห์ แนะนำ และกำหนดเวลา ตลอดจนเลือกยาที่ได้ผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย ความถี่ของการให้ยาเคมีบำบัดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสูตรยาที่ใช้และสภาพร่างกายของผู้ป่วย เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน บางครั้งอาจต้องหยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาพักและซ่อมแซมเซลล์ปกติให้แข็งแรงพอที่จะให้ยาครั้งต่อไปได้

ผู้ป่วยบางรายอาจท้อแท้ เนื่องจากระยะเวลาอันยาวนานของการรักษา ถ้าหากมีความกังวลใจ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล แพทย์อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา เป็นระยะ โดยมาตรวจตรงตามแพทย์นัดและให้ยาตรงตามแผนการรักษา

การได้ยาไม่ครบหรือระยะเวลาไม่ตรงกำหนดจะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อการรักษา ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนระยะเวลาการให้ยาควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนทุกครั้ง



## ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ได้รับยาเคมีบำบัดมีดังนี้

1. **ระยะเฉียบพลัน** เกิดภายในเวลา **เป็นนาที** ได้แก่ ช็อคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตลดลง ปวดจากการระคายเคือง
2. **ระยะแรก** เกิดภายในเวลา **เป็นชั่วโมง** ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ ภาวะแพ้สภาวะอักเสบ อากาศแพ้
3. **ระยะกลาง** เกิดภายในระยะเวลา **เป็นวัน** ได้แก่ ไขกระดูกถูกกด เยื่อช่องปากอักเสบ ผมร่วง ซาตามประสาท (ซาตามปลายมือ ปลายเท้า) ไตวาย ระบบภูมิคุ้มกันถูกกด
4. **ระยะท้าย** เกิดภายในระยะเวลา **เป็นเดือน** ได้แก่ มีอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต ผิวหนังมีสีคล้ำ ไม่มีประจำเดือนเป็นหมันชั่วคราว มีการเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อ มีผลต่อทารกในครรภ์ อาจพบภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย

## การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด

### การดูแลตนเองหลังให้ยาเคมีบำบัด

#### ➤ กตไช้กระดูก ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำ

เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย เมื่อปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลงทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายจะเกิดขึ้น 7 - 14 วัน ภายหลังรับยาและจะกลับมาปกติ จึงควรปฏิบัติดังนี้

- รักษาความสะอาดของร่างกาย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ใช่มือสกปรก ขี้ตาหรือแคะจมูกรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ที่เป็นไข้หวัด หรือเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน แออัดหรือที่ที่มีการระบาดของเชื้อโรค
- ระมัดระวังการเกิดบาดแผลบริเวณผิวหนัง
- ขณะได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนี้ ไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีน ใดๆ โดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ถ้าเกิดการเจ็บป่วย เช่น ไข้หรือหนาวสั่น ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ ปวดหรือ แสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ หรือท้องเสีย ไม่ควรรักษาด้วยตนเองควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

#### ➤ อุณหภูมิร่างกาย $\geq 38.0$ องศาเซลเซียส ถือว่า มีไข้

## การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด

### การเตรียมตัวก่อนให้ยาเคมีบำบัด

1. แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว และประวัติการเกิดโรคอื่น ๆ ได้แก่ อีสุกอีใส งูสวัด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคปอด
2. แจ้งให้แพทย์ทราบถ้ากำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือกำลังวางแผนเพื่อการมีบุตร เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ ควรคุมกำเนิด และหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
3. แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาชนิดอื่นที่กำลังใช้อยู่ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาใด ๆ

### ด้านร่างกาย

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้
2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และ เพิ่มการนอนพักในตอนกลางวัน 1-2 ชั่วโมง/วัน
3. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบ





## อาหาร..ปัจจัยสำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมสู้กับมะเร็ง

- **ข้าว แป้ง** ควรรับประทานข้าวและแป้งเป็นหลัก และในกรณีเบื่ออาหารประเภทข้าวสามารถเลือกใช้ขนมปังแทนได้ โดยหากได้รับพวกข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวซ้อมมือก็จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่างมาก
- **เนื้อสัตว์** สามารถรับประทานได้ทุกชนิด โดยเน้นเนื้อสัตว์คุณภาพดีไม่ติดมัน อาจเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา ปลาเล็กปลาน้อย เป็นต้น ไข่ไก่ 1 ฟองต่อวัน หรือ ต้มนมพร่องมันเนยร่วมด้วยก็ได้
- **ไขมัน** ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดจากน้ำมันซ้ำๆ ควรรับประทานไขมันแต่พอดี ประมาณ 5 ช้อนชา /วัน และไม่ควรใช้น้ำมันในการปรุงประกอบอาหารที่มากจนเกินไป และเลือกกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งแทน เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว เป็นต้น
- **ผัก** รับประทานพืชผักสีเขียวเข้ม ทั้งเหลือเข็มและเขียวเข็ม เช่น ผักตระกูลกะหล่ำ จะมีสาร isothiocyanate ซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฟักทอง บรอกโคลี มะเขือเทศ ผักเหล่านี้จะมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
- **ผลไม้** รับประทานได้ทุกชนิดโดยเน้นผลไม้ที่มีสีส้ม , แดง และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล มะละกอ องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ กัลฉ่าย ผลไม้เหล่านี้จะมีสารที่ช่วยป้องกันมะเร็ง เช่น fiber , phenol ,flavonoid, carotenoid เป็นต้น
- **เมล็ดธัญพืช** ข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือย งา ถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ฯลฯ จัดเป็นอาหารต้านมะเร็ง โดยเฉพาะถั่วเหลืองมีปริมาณกรดอะมิโนสูงและยังมีกากใยมาก ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยอาหารและดูดซึมอาหารได้ดีรวมถึงมีปริมาณแร่ธาตุหายากมากกว่า อาหารประเภทอื่นๆ เช่น ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ธาตุซีลีเนียม ซึ่งช่วยต้านมะเร็งได้ดี

## การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด

### ด้านจิตใจ

1. ควรทำอารมณ์ จิตใจ พร้อมรับการรักษา
2. ลดความกลัว ความวิตกกังวล
3. สร้างความมั่นใจใน การดูแลรักษา รวมทั้งสามารถลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
4. แพทย์และพยาบาลควรประเมินภาวะวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค และการดูแลตนเองของผู้ป่วย



### การดูแลตนเองขณะรับยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษา ถ้าผู้ป่วยร่วมมือด้วยการ ดูแลตนเองและร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำจะช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นควรดูแลตนเองดังนี้

1. สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยมียารั่วซึมออกนอกเส้นเลือด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที
2. เมื่อมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก หรือมีผื่นขึ้นตามลำตัวให้แจ้งพยาบาลทันที เพื่อรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3. ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง ให้แจ้งพยาบาลทันที

## กรณีพบปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-5022345 ต่อ 1337

หรือ หน่วยการพยาบาลเคมีบำบัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เบอร์โทร 02-5022345 ต่อ 1337